



FISSURA PERIANAL EM PASTOR ALEMÃO: RELATO DE CASO

DÉBORA EVELLYN CAVALCANTE DA SILVA; ESTER PEREIRA CAVALCANTI; IOHANA
RAISSA GOMES DE FRANÇA

Introdução: A fístula perianal é uma doença crônica inflamatória caracterizada pelo desenvolvimento primitivo de lesões na região perianal de cães, que variam de gravidade iniciando primeiro como um pequeno orifício que gradualmente vai aumentando de tamanho. As lesões podem ser únicas ou múltiplas, ulcerosas, com ou sem envolvimento do saco anal. **Objetivo:** O estudo tem como objetivo relatar os sinais clínicos apresentados e tratamento aplicado em um caso de fístula perianal em um Pastor Alemão, que foi atendido na Clínica Escola Centro Médico Veterinário da Faculdade Rebouças, em Campina Grande, Paraíba. **Relato de Caso:** Foi atendido um cão da raça Pastor Alemão, seis anos de idade, macho não castrado, apresentando dermatite com presença de secreção purulenta em dorso(pelve), fístula lateral de ânus com presença de secreção serosanguinolenta e necrose perianal, onde foi retirada miíases. Quando filhote apresentava ferida na pelve e diarreia constante, apresentou alteração no sistema digestório tendo diarreia pastosa com sangue. Apresentou linfonodos aumentados, mucosas congestionadas e caso de desidratação, seu tpc estava em 4". Sua frequência cardíaca e respiratória estavam normais, estava consciente e sua temperatura retal não foi visualizada devido ao tamanho da lesão e necrose. Para o fechamento da fístula foi realizadas duas cirurgias, porém os pontos abriram devido a força que o animal realizava e a contração do músculo. Foram realizadas limpezas três vezes ao dia, para reduzir a carga de contaminantes, hidratar a superfície da ferida, facilitar a visualização do tamanho e gravidade da ferida com intuito de ver a evolução do tratamento. Nas limpezas, foi utilizada a pomada Kollagenase de uso dermatológico indicada no tratamento de lesões de pele, a pomada Hirudoid indicada para processos inflamatórios, foi realizado o uso de soro fisiológico, lavagem com água corrente e uso de Furanil. Foi utilizado colar Elizabetano prevenindo a lambedura perianal e a chegada de microrganismos na região. Devido ao aumento da higienização, tecido de granulação começou a surgir ao redor da fístula perianal, o que foi um grande avanço no tratamento. **Conclusão:** Conclui-se que a raça Pastor Alemão são mais acometidos nesses casos, e a limpeza do local que o animal reside e da região perianal é imprescindível, já que para a cicatrização é necessário ser realizado a limpeza, no intuito de combater microrganismos e evitar a disseminação de lavas, e principalmente para a evolução do tratamento.

Palavras-chave: **PASTOR ALEMÃO; TRATAMENTO; RAÇA; RELATO; SINAIS CLÍNICOS**