



TIPOS DE OTITE MÉDIA CRÔNICA E SEUS RESPECTIVOS QUADROS CLÍNICOS: UMA REVISÃO

HISTENIO SIQUEIRA AFONSO BORGES; LUÍSA DE FARIA ROLLER; GIOVANNA LADEIRA ERRICO; LAVÍNIA DE SOUZA TELES; RONES DIAS DA COSTA FILHO

Introdução: A Otite Média Crônica (OMC) foi definida como um estado inflamatório da mucosa da orelha média que acomete desde a membrana timpânica até as cavidades associadas à tuba auditiva com duração maior que 3 meses. Em termos de quadro clínico, há a secreção mesmo com a membrana timpânica íntegra ou perfurada e pode ser associado ao acometimento do ouvido médio ou mastóide. Por se tratar de um processo mais importante que o quadro agudo, a Otite Média Crônica está relacionada a diversas consequências anatômicas e funcionais. **Objetivo:** O presente trabalho tem por objetivo diferenciar os tipos de Otite Média Crônica quanto ao quadro clínico. **Metodologia:** O estudo foi desenvolvido a partir de uma revisão de literatura, por meio de pesquisas na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), por meio dos descritores: “Otite Média Crônica” e “Quadro Clínico”. Foram encontrados 3 artigos que conferiram relevância e atualidade para o estudo, publicados entre 2020 e 2023. **Resultados:** A partir dos 3 artigos utilizados, foi visto que existem 4 tipos de Otite Média Crônica mais comuns, e o primeiro se trata da OMC simples. Nessa patologia, ocorre otorreia intermitente, com secreção de aspecto fluido ou de muco, sem odor, e hipoacusia de grau variável. Além disso, raramente estão associados sintomas como otalgia e zumbido. Já na OMC supurativa, o paciente cursa com otorreia persistente, de coloração amarelo-esverdeada e odor fétido, associadas a otalgia. Nesse caso, pode evoluir com metaplasia epidermoide da mucosa. Enquanto isso, a OMC silenciosa se trata de uma doença de difícil diagnóstico, visto que pode cursar com sintomas, porém, ao exame, pode não apresentar alterações. Por fim, a OMC colesteatomatosa possui o quadro clínico variável de acordo com a localização e o tipo do colesteatoma, variando desde a assintomatologia até a paralisia facial. **Conclusão:** Foi observado que as Otites Médias Crônicas possuem quadro clínico distintos e podem variar de acordo com o grau de acometimento. É de suma importância que a avaliação de um profissional qualificado seja feita para que haja o diagnóstico correto da doença, tendo em vista suas formas assintomáticas.

Palavras-chave: **OTITE MÉDIA CRÔNICA; QUADRO CLÍNICO; TIPOS; OTORREIA; SINTOMATOLOGIA**