



POTENCIAL METASTÁTICO PULMONAR DECORRENTE DO CARCINOMA ORAL DE CÉLULAS ESCAMOSAS: CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-PATOLÓGICAS

ROBSON HELENO DE MOURA; RAFAEL DE SOUSA CARVALHO SABÓIA; MARIANA KARINE CABRAL DA SILVA; NAEDJA NAYANE DA SILVA; PATRÍCIA VIVIANE DE ANDRADE SANTOS

Introdução: O carcinoma oral de células escamosas, também conhecido como carcinoma espinocelular, é o tumor maligno mais frequente na cavidade oral, com elevada taxa de mortalidade, mesmo com avanços terapêuticos. Quando não diagnosticado precocemente, possui um alto potencial metastático, geralmente por via linfática, afetando outros órgãos, como o pulmão. **Objetivo:** Analisar as características clínico-patológicas e discutir a importância do diagnóstico clínico-laboratorial do carcinoma oral de células escamosas, focando nas possíveis metástases pulmonares. **Metodologia:** Este estudo consiste em uma revisão de literatura com base em artigos das plataformas SciELO e PubMed, considerando publicações em inglês e português, entre 2014 e 2024. Os descritores utilizados foram: "Neoplasias de Cabeça e Pescoço", "Metástase Neoplásica", "Neoplasias Pulmonares", "Diagnóstico Bucal" e "Neoplasias da Língua", conforme o DeCS/MeSH. Artigos que não atendiam a esses critérios foram excluídos além daqueles com baixa relevância ou pouca relação com o tema. **Resultados:** O carcinoma oral de células escamosas apresenta maior incidência em adultos entre 50 e 60 anos, frequentemente afetando a língua e o assoalho bucal. A alta vascularização linfática da língua contribui para o maior risco de metástase cervical. A presença de metástases diminui significativamente o prognóstico, reduzindo em até 50% a taxa de sobrevida dos pacientes. Nos estágios III e IV, a recorrência é comum nos dois primeiros anos após o tratamento. Metástases pulmonares podem ser ocultas, mesmo sem alterações palpáveis nos linfonodos, o que reforça a importância da tomografia computadorizada de tórax como exame complementar para a detecção precoce de lesões pulmonares metastáticas. **Conclusão:** O diagnóstico clínico-laboratorial eficaz do carcinoma oral de células escamosas, especialmente em relação às metástases pulmonares, depende de uma abordagem integrada que envolva exames histopatológicos detalhados e o uso de exames de imagem. A detecção precoce de metástases ocultas, mesmo sem alterações linfonodais, é crucial para melhorar o prognóstico dos pacientes. Portanto, a associação de técnicas diagnósticas e o manejo multidisciplinar são essenciais para otimizar o tratamento e aumentar as taxas de sobrevida dos pacientes.

Palavras-chave: **DIAGNÓSTICO BUCAL; METÁSTASE NEOPLÁSICA; ; NEOPLASIAS DA LÍNGUA; NEOPLASIAS PULMONARES; NEOPLASIAS DE CABEÇA E PESCOÇO**