



LINFOMA DIFUSO DO TRATO GASTROINTESTINAL EM CANINO DA RAÇA PUG - RELATO DE CASO

RAQUEL PASSOS OLIVEIRA; HENRIQUE LEITE FRANÇA GOMES; JESSICA TORRES
MATOS; EDNEY LEITE DE MENDONÇA; JOÃO VITOR OLIVEIRA BOMFIM

Introdução: O linfoma, ou linfossarcoma, trata-se de um tumor que atinge o sistema linfático. É detectado em cães e gatos, porém, é mais encontrado em cães jovens ou idosos. **Objetivo:** Neste trabalho, objetivou-se relatar um caso de linfoma difuso do trato gastrointestinal em canino, atendido em clínica veterinária na cidade de Aracaju - SE, bem como, descrever o método realizado no seu diagnóstico e tratamento. **Relato de caso:** Foi atendido na Clínica Veterinária em Aracaju-SE, um canino da raça Pug, macho, pesando 8,400 Kg, com 10 anos de idade e vacinação regular. A tutora relatou que o animal apresentava um quadro de diarreia pastosa e volumosa. Suspeitou-se de hemoparasitose, iniciando protocolo de tratamento com a doxiciclina, que não obteve sucesso e apresentou uma inflamação no revestimento interno do estômago. Na ultrassonografia, foi constatado mesentério reativo e gastrite. O hemograma apresentou anemia normocítica normocrômica; trombocitose; leucocitose por neutrofilia; linfocitose absoluta; monocitopenia relativa; macro-plaquetas; anisocitose; hemácias em alvo e hemácias em rouleaux. O bioquímico apresentou uremia (61), AST (160,2), fosfatase alcalina (264,5), proteínas totais (3,9), albumina (2,0), globulinas (1,9), triglicérides alto. A citologia fecal constatou bactérias de morfologia bastonetes monomórficos e moderados cocos/diplococos. Na endoscopia, constatou linfoma difuso do trato gastrointestinal. Diante do diagnóstico, o paciente entrou no tratamento com CHOP. Após dois dias da 1ª sessão de quimioterapia, o paciente retornou com queixa de diarreia, apatia e pressão arterial no limite inferior, sendo encaminhado para um hospital veterinário. Com a evolução dos sinais clínicos e piora do quadro, o paciente veio a óbito, com diagnóstico presuntivo de Síndrome da Lise Tumoral (SLT). **Conclusão:** O linfoma difuso do trato gastrointestinal, tem um prognóstico desafiador por tratar-se de uma neoplasia maligna. Os tratamentos para a doença prolongam a sobrevida do animal, mas são bastante invasivos, como a quimioterapia que pode causar reações irreversíveis, como o relatado neste estudo de caso.

Palavras-chave: **CÃES; ENDOSCOPIA; GASTROINTESTINAL; LINFOMA; ULTRASSONOGRAFIA**