



MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DO DESCOLAMENTO DE RETINA: ABORDAGENS NA PRÁTICA OFTALMOLÓGICA

LINA MIYURI SUIZU; SAMYA ALI ABDEL FATTAH COSTA; NICOLE ROSENTHAL WINCKLER DA SILVA; JULIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

Introdução: O descolamento de retina ocorre quando a retina se separa do epitélio pigmentar subjacente. Existem três tipos principais: o regmatogênico, causado por rupturas retinianas; o tracional, devido à tração mecânica; e o exsudativo, associado ao acúmulo de fluido subretiniano, sem rupturas ou tração direta. **Objetivo:** Apontar as manifestações clínicas do descolamento de retina tracional. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão narrativa de literatura que utilizou artigos publicados nos últimos 5 anos em inglês na PUBMED. Para a busca, utilizou-se o unitermo "*Retinal Detachment*", onde apenas 31 dos 3571 estudos foram incluídos por convergirem com o objetivo almejado, excluindo os demais. **Resultados:** As manifestações clínicas do descolamento de retina tracional geralmente se apresentam insidiosamente, evoluindo com a piora progressiva da visão. Inicialmente, os pacientes podem relatar a presença de "sombras" ou "cortinas" escuras em áreas do campo visual da periferia em direção ao centro. Em alguns casos, há a percepção de metamorfopsia e dificuldade na visualização de detalhes, manifestando como visão embaçada ou borrada. A perda visual pode ser localizada ou difusa, dependendo da extensão do descolamento. Outra manifestação comum inclui a presença de escotomas, áreas de perda visual no campo de visão, que podem variar em tamanho e localização. A gravidade dos sintomas está associada ao grau de tração na retina e à extensão do comprometimento retiniano. O descolamento de retina tracional, por sua característica crônica e progressiva, pode evoluir de forma assintomática até atingir áreas centrais da visão, especialmente quando com envolvimento macular. Em estágios avançados, a diminuição acentuada da acuidade visual pode se tornar irreversível. A ausência de dor ou inflamação distingue essa condição de outros tipos de descolamento de retina. Embora alguns pacientes possam perceber sinais premonitórios, como flashes de luz (fotopsias) ou manchas flutuantes no campo de visão, esses sintomas são menos frequentes no descolamento tracional quando comparado a outros tipos de descolamento retiniano. Portanto, o diagnóstico precoce é crucial para evitar danos permanentes à visão. **Conclusão:** As principais manifestações clínicas do descolamento de retina incluem perda progressiva da visão, sombras no campo visual, visão embaçada, escotomas e, ocasionalmente, flashes de luz (fotopsias) ou manchas flutuantes.

Palavras-chave: **RETINA; DIAGNÓSTICO PRECOCE; ESCOTOMA; OFTALMOPATIAS; CEGUEIRA**