



PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS INFECÇÕES PELO VÍRUS VARICELA-ZOSTER NA REGIÃO NORTE DO BRASIL ENTRE 2014 A 2024

EVELYN RAFAELA LUNARDELLI SILVA; IURY FERNANDO RODRIGUES DA SILVA;
LUIZA VARGAS LENKER; ANA BEATRIZ RODRIGUES MUSSY; MARIA EDUARDA
WOZINSKI DA SILVA

Introdução: O herpes zoster é uma condição resultante da reativação do vírus varicela zoster (VVZ), o qual também é responsável pela varicela. Depois que uma pessoa contrai varicela, o vírus se mantém latente no organismo e pode reemergir anos posteriormente, levando ao desenvolvimento do herpes zoster. **Objetivo:** Analisar o quadro epidemiológico do total de infecções provocadas pelo vírus varicela zoster na região Norte do Brasil, entre os anos de 2020 a 2024. **Metodologia:** Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, com dados coletados em fevereiro de 2025 no Sistema de informações hospitalares do SUS. Analisou-se a taxa de infecções por herpes zoster nos estados do Norte do Brasil, considerando número de casos por ano, unidade da federação, idade, sexo e raça/cor, entre 2020 à 2024. **Resultados:** No período analisado, foi constatado que no ano de 2022 houve aumento nos casos de VVZ em comparação aos anos anteriores (32.39%). Do total de quadros, o estado do Pará e Rondônia representaram os maiores índices da região Norte (46.05% e 39.60% respectivamente). Entre a Cor/raça, os pardos foram mais acometidos (64.15%). Seguindo por faixa etária, idosos de 70 a 79 anos representam parcela significativa (20.86%). Enquanto por sexo, percebeu-se prevalência no sexo masculino (53%) em todos os anos observados, em exceção 2023 em que o sexo feminino apresentou maior número de casos de VVZ. **Conclusão:** De 2020 a 2024, o Brasil observou um crescimento considerável nos casos de herpes zoster. Esse incremento pode ser relacionado ao envelhecimento da população, ao avanço na detecção da doença e à baixa cobertura vacinal contra o vírus.

Palavras-chave: ; **DOENÇA; HERPES; VACINA**