



PREVALÊNCIA DA SÍFILIS E SUA DIVERSIDADE DE MANIFESTAÇÕES - RELATO DE CASO

RAFAELA RESENDE DA GLÓRIA; ANNA LUISA MOREIRA MELO; ISABELA RESENDE DA GLÓRIA

Introdução: A Sífilis é a doença sexualmente transmissível que mais está aumentando no mundo, atingindo um total de 8 milhões no mundo. Foi descrita na literatura como o “grande imitador” devido à variedade de manifestações clínicas. A doença se manifesta de acordo com o estágio de desenvolvimento. Pode ser classificada entre sífilis primária, secundária, terciária e latente. O estágio mais crítico é na Sífilis Terciária, podendo ocorrer cegueira, paralisia, problemas cardíacos e morte. **Objetivo:** Relatar um caso clínico de forma a destacar a prevalência, variedade de manifestações e gravidade da sífilis no Brasil. **Relato de caso:** Paciente 52 anos, homem, casado, hígido, iniciou com quadro de edema importante em membros, bilateral e simétrico, associado a espumúria e urina concentrada há 3 dias. Há 1 mês apresentou fadiga, epigastralgia, poliartralgia e descamação das mãos. Sorologias e marcadores reumatológicos negativos, discreta alteração da função renal, piora das enzimas hepáticas, proteinúria significativa, elevação do colesterol e hipoalbuminemia. A biópsia renal demonstrou Glomerulopatia Membranosa estágio I/II. Novamente realizada sorologias, com VDRL 1:512 e FTA-abs IgM positivo, confirmado o diagnóstico de glomerulopatia sífilítica. Realizada Penicilina Benzatina G durante 3 semanas com redução dos títulos após 2 meses, associado a diurético, antagonista do receptor de angiotensina II e restrição hídrica. **Conclusão:** O caso relatado é referente a uma sífilis secundária, em que se desenvolve semanas a meses após a exposição e pode apresentar uma ampla diversidade de sintomas, como erupção maculopapular, adenopatia, sudorese noturna, ganho de peso inexplicável, anormalidades gastrointestinais, entre outros. As manifestações renais são raras, sendo a nefropatia membranosa a lesão glomerular mais comumente relatada associada à doença. Pode evoluir para formas tardias que envolvem órgãos vitais, como o coração e o sistema nervoso central, podendo causar complicações graves e, até mesmo, a morte. O tratamento baseia-se na aplicação da Penicilina G Benzatina intramuscular. Portanto, destaca-se a importância da identificação precoce da doença, ressaltando sua variabilidade de apresentação devido ao acometimento sistêmico e sua potencial gravidade em indivíduos não tratados ou inadequadamente tratados.

Palavras-chave: **SÍFILIS; SÍNDROME NEFROTICA; GLOMERULOPATIAS**