



RELATO DE CASO: REMOÇÃO CIRÚRGICA DE MELANOMA. CAUDECTOMIA COMO ALTERNATIVA DE MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA

LUANNA MATIAS RIBEIRO CABRAL; ELIZABETH ACIOLE TORCHIA DA SILVA;
EVERTON FERNANDES DOS SANTOS CABRAL

Introdução: Este relato de caso descreve a caudectomia em uma mula de 18 anos com histórico de melanoma reincidente na cauda. O melanoma é uma neoplasia maligna que afeta os melanócitos e é frequentemente observada em equinos de pelagem tordilha. No caso descrito, o animal apresentou múltiplas massas tumorais, o que levou à indicação da remoção da cauda devido à reincidentência, ao tamanho das lesões e à sua abundante irrigação sanguínea. **Objetivo:** O objetivo deste trabalho, é trazer a caudactomia como opção de melhora na qualidade de vida e prevenir complicações futuras, como a compressão do ânus, nos animais acometidos a este problema. **Materiais e Métodos:** O procedimento iniciou-se com a tricotomia da região onde foi feita a cirurgia e na área da anestesia epidural, seguida de assepsia do local, feita com clorexidina, seguida por iodo povidine degermante, álcool iodado e finalizando com álcool 70%. Para sedação, foi utilizada detomidina com o animal em estação na baia de contenção, foi usada lidocaína para a anestesia epidural e local, com um botão anestésico e a aplicação de 2 ml da solução via cateter. Para melhorar a coagulação sanguínea, foi administrado vitamina K. Para prevenir infecções como o tétano, foi administrado soro antitetânico. Após a remoção da cauda, foi realizada a cauterização, seguida da aplicação de vitamina K diretamente no local para reduzir o sangramento, e então foi feita a sutura. Em seguida, realizou-se assepsia com aplicação de terracortril e ganadol e foi fechado o curativo, passando algodão antes da atadura, para não prejudicar a circulação. Para o pós-operatório, foi recomendado continuar a assepsia da ferida utilizando clorexidina, povidine degermante, álcool 70%, juntamente com terracortril e ganadol para garantir uma boa cicatrização e prevenção de infecções. Além disso, foram prescritos, por oito dias, 20 ml de penicilina pensilvet Plus e 10 ml do anti-inflamatório não esteroide flumedin para controle da dor e inflamação. **Resultados:** O animal apresentou boa recuperação, sem intercorrências significativas no pós-operatório. **Conclusão:** Devido a reincidentência, que poderia prejudicar as condições fisiológicas do animal, a caudectomia, mostrou-se a melhor alternativa, possibilitando uma melhora no bem estar do animal.

Palavras-chave: **NEOPLASIA; CAUDA; MULA**