



DIFERENCIAIS REGIONAIS DA MORTALIDADE POR FEBRES POR ARBOVÍRUS E FEBRES HEMORRÁGICAS VIRAIS EM RELAÇÃO AO GÊNERO NO PERÍODO DE 2012 A 2022 NO BRASIL

PRISCILA GOMES DE MELLO; CRISANY MACHADO DA SILVA; LUANA CRISTINA TORRES DE LIMA; CATIANE GOMES CABRAL; TAYNARA DE SOUSA ARAÚJO

Introdução: As febres hemorrágicas virais fazem parte de um grupo de doenças virais nas quais estão incluídas as arboviroses que tem como principais sintomas o quadro febril e a hemorragia. Os principais agentes etiológicos são artrópodes (insetos e aracnídeos). **Objetivo:** identificar as diferenças regionais de mortalidade por febres por arbovírus e febres hemorrágicas virais no período de 2012 a 2022 no Brasil. **Materiais e Métodos:** estudo analítico e retrospectivo no qual foram consultados dados no sistema de mortalidade (SIM), sistema de internação hospitalares (SIH), sobre as notificações, evolução dos casos notificados quanto a mortalidade e a letalidade da febre maculosa nas regiões brasileiras e estratificadas por sexo utilizado a base de dados do DATA SUS e as ferramentas Tabnet e TabWin. **Resultados:** Foram identificadas que o total das internações hospitalares no Brasil foi de 22.301, sendo homens = 11.444 (51,31%) e mulheres= 10.857 (48,68%). As regiões brasileiras com maiores registros de internações hospitalares em relação a ocorrência foram as regiões Nordeste com 11776 (52,80%), sendo em homens 5.616 (47,69%) e mulheres 6.160 (52,31%); na região norte com 4.411 (19,78%), sendo em homens 2342 (53,09%) e mulheres 2069 (46,91%); e a região sudeste 4.168 (18,69%), sendo em homens 2357 (56,55%) e de mulheres 1.811(43,45%). A taxa de mortalidade na população brasileira foi de 1,74%, na população de homens foi de 1,98% e na população feminina de 1,48%. As regiões brasileiras que apresentaram maiores taxas de mortalidade foram as regiões Sudeste com 4,15%, homens de 4,29% e mulheres de 3,98%, e Sul com 2,6%, sendo homens de 2,45% e mulheres de 2,88%. **Conclusão:** Portanto, foram identificadas que da região nordeste houve maiores registros de internações hospitalares e menores taxas de mortalidade se comparadas com as regiões sudeste e sul. Não houve diferenças significativas quanto ao gênero em relação a mortalidade.

Palavras-chave: **DENGUE; ZOONOSES; ARBOVIROSES; VÍRUS; HEMORRAGIA**