



INCIDÊNCIA DE DERRAME PLEURAL NA ENFERMARIA DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO EM CANINDÉ: UMA REVISÃO DE LITERATURA

LUIZ DAVI MARTINS PEREIRA; FELLIPE TIAGO DANTAS LINHARES; KENIA CAROLINI SOARES SOUSA; DOMINIQUE VIEIRA TAVARES; TÉRCIA MONTENEGRO HOLANDA; HELOISA ALVES CAJADO; ANDERSON MORAIS DE FREITAS; ÍTALO VERAS DE SOUSA; MELINA ALMEIDA PINTO; CLARICE PIRES XAVIER; HELBER FABRICIO MAIA REIS

INTRODUÇÃO: O derrame pleural é uma condição clínica prevalente e complexa caracterizada pelo acúmulo anormal de fluido na cavidade pleural, que é o espaço virtual entre as membranas pleurais visceral e parietal que envolvem os pulmões e revestem a parede torácica, respectivamente. Esta condição pode ser aguda ou crônica e pode resultar de uma ampla variedade de etiologias, incluindo processos inflamatórios, infecciosos, neoplásicos, traumáticos, metabólicos, e doenças de base como insuficiência cardíaca, doenças autoimunes e doenças pulmonares. **OBJETIVO:** Analisar os estudos disponíveis sobre a incidência de derrame pleural na enfermaria do Hospital São Francisco em Canindé. **METODOLOGIA:** Para investigar a incidência de derrame pleural na enfermaria do Hospital São Francisco em Canindé foi realizada uma coleta de dados, através de uma revisão literária integrativa, com base no autor Rother (2018). Para isso, foram adotados passos metodológicos, começando pela identificação do problema de pesquisa: a incidência específica dessa condição em um contexto hospitalar específico. **RESULTADOS:** Primeiramente, foi observada uma variabilidade na incidência de derrame pleural entre os estudos incluídos na revisão. Embora alguns estudos tenham relatado uma incidência relativamente baixa, outros apontaram para uma prevalência mais elevada dessa condição na enfermaria do Hospital São Francisco. Além disso, a análise dos fatores associados à incidência de derrame pleural revelou algumas tendências interessantes. Por exemplo, foi observado que a idade dos pacientes desempenhou um papel importante, com uma maior incidência de derrame pleural em pacientes mais idosos. Foi observado um aumento na incidência durante determinadas épocas do ano, possivelmente associado a picos sazonais de doenças infecciosas respiratórias ou outras condições ambientais específicas da região. **CONCLUSÃO:** Nas considerações finais sobre a incidência de derrame pleural na enfermaria do Hospital São Francisco em Canindé, é importante ressaltar alguns pontos cruciais. Em primeiro lugar, é essencial reconhecer que o derrame pleural é uma condição clínica multifacetada e complexa, que pode ser causada por uma variedade de fatores, incluindo doenças pulmonares, cardíacas, infecciosas e neoplásicas. Portanto, a abordagem diagnóstica e terapêutica para pacientes com suspeita ou diagnóstico de derrame pleural deve ser abrangente e baseada em evidências, levando em consideração as características individuais de cada paciente.

Palavras-chave: **DERRAME PLEURAL; MEDICINA; CANINDÉ**