



SIMILARIDADE DO QUADRO CLÍNICO DE CRISES DE AUSÊNCIA E TDAH EM CRIANÇAS

LÉO DOMINGUES MARCHESI; GABRIELY HAMUD

Introdução: As crises de ausência, um tipo de crise convulsiva generalizada, são episódios de curta duração, entre 5 a 30 segundos, que podem ocorrer várias vezes ao decorrer do dia. Eles são caracterizados por uma perda abrupta e temporária da consciência, em decorrência de uma descarga elétrica anormal que afeta a atividade cerebral. Estas crises são mais prevalentes no sexo feminino e em crianças, sendo frequentemente despercebidas e confundidas com o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, devido a similaridade da sintomatologia. Ambos podem ocasionar um olhar vago e perdido, pausas repentinas, prejuízos na realização de tarefas habituais e queda do rendimento escolar. **Objetivo:** Evidenciar as semelhanças entre as duas condições clínicas, bem como a importância do diagnóstico correto através de exames complementares específicos, haja vista que os tratamentos diferem para cada patologia. **Metodologia:** Trata-se de um resumo simples, elaborado a partir de uma busca nos seguintes bancos de dados: Pubmed e Scielo, sendo analisados os artigos publicados nos últimos 5 anos. **Resultados:** Foi constatada a importância da realização de exames complementares específicos de cada patologia, visando um diagnóstico assertivo. As crises de ausência, são diagnosticadas através da prova de hiperventilação pulmonar positiva, bem como pelo eletroencefalograma, caracterizado pela presença de paroxismos epileptiformes, síncronos e simétricos, de morfologia regular e início e término abruptos. O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, é diagnosticado se houver 6 ou mais sintomas de um ou ambos os grupos (desatenção e hiperatividade-impulsividade), de acordo com o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5). **Conclusão:** Frequentemente, devido a semelhança do quadro clínico, a crise de ausência é subdiagnosticada por ser equivocadamente associada ao Transtorno do Déficit de Atenção. É de fundamental importância que os familiares se atentem aos sinais e sintomas e procurem atendimento médico, para que seja realizado os exames necessários para um diagnóstico correto, pois há um tratamento específico para cada condição, sendo utilizados antiepilépticos para as crises de ausência e terapias complementares para ambas.

Palavras-chave: **CRIANÇAS; TDAH; CRISE AUSÊNCIA; SINTOMAS; DIAGNÓSTICO**