



MANEJO PARA PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO EM PACIENTES COM COVID-19 INTERNADOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: REVISÃO INTEGRATIVA

LUCIANO NUNES DE OLIVEIRA; JOYCE VIEIRA BARBOSA; EUNI DE OLIVEIRA CAVALCANTE

INTRODUÇÃO: Lesão por pressão (LPP) é uma injúria na pele ou tecido subjacente, geralmente em uma proeminência óssea, secundária ao aumento da pressão externa ou pressão associada ao cisalhamento. Uma revisão sistemática indica que os pacientes internados em uma unidade de terapia intensiva (UTI) são mais vulneráveis à incidência desse fenômeno. Com o surgimento da pandemia, tivemos um aumento exponencial dos casos de internação em leitos de terapia intensiva de pacientes COVID-19, o que nos traz a necessidade de evidenciar qual o manejo para prevenção LPP em pacientes com COVID-19 internados na UTI. **OBJETIVO:** Evidenciar na literatura o manejo para prevenção de LPP em pacientes com COVID-19 internados na UTI. **METODOLOGIA:** Revisão integrativa de artigos publicados sobre o tema relacionado a pacientes com COVID-19 internados na Unidade de Terapia Intensiva nas bases de dados PubMed, LILACS, MEDLINE, BDENF, sendo os descritores utilizados: lesão por pressão, úlcera por pressão, unidade de terapia intensiva, COVID, posição prona. Questão Norteadora: Qual o manejo para prevenção de LPP em pacientes com COVID-19 internados na UTI? **RESULTADOS:** Foram utilizados 13 artigos nesta etapa, concluindo assim, que a LPP relacionada ao paciente com COVID-19 foi vista como uma das complicações mais comuns na UTI, principalmente aqueles submetidos a posição prona. Outros fatores observados foram a sobrecarga de trabalho por parte dos profissionais de saúde, quebra de protocolos de prevenção de LPP ou a falta de protocolos baseados em evidências científicas. Além disso, a posição prona para ser efetivada deve ser mantida por longos períodos, e isso pode levar a pontos de pressão na pele, levando a possível dano isquêmico e consequentemente ocasionando uma LPP. **CONCLUSÃO:** O COVID-19 trouxe uma nova realidade mundial, a incidência de pacientes com LPP em posição prona aumentou, além de todos os fatores intrínsecos e extrínsecos do COVID-19 abordados nesse trabalho, que contribui para o desenvolvimento da lesão. Por ser de grande incidência, mas de difícil acesso à informação, os profissionais de saúde, principalmente a classe da enfermagem, devem elaborar implementações para a prevenção de LPP em posição prona, no contexto COVID-19.

Palavras-chave: Lesão por pressão, úlcera por pressão, Unidade de terapia intensiva, Covid, Posição prona.