



EPIDEMIOLOGIA GLOBAL DO CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS NA CAVIDADE ORAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA

JOÃO EVANGELISTA PONTE CONRADO; FELIPE RODRIGUES GONÇALVES; MARIANA CALDAS BORGES; OLAVO PEREIRA DE LIMA NETO; RÉGIS PONTE CONRADO

Introdução: Câncer de cavidade oral é uma das neoplasias mais comuns do mundo, notadamente em países em desenvolvimento. O carcinoma de células escamosas distingue-se entre essas neoplasias por ser a mais comum, sendo, em proposta utilitarista, digna de análise. **Objetivos:** Entender o carcinoma de células escamosas do ponto de vista epidemiológico a nível global. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão da literatura realizada utilizando a base de dados PubMed, coletando artigos publicados em inglês de 2015 a 2019. Os DeCS utilizados foram: “Carcinoma, Squamous Cell”, “Mouth Neoplasms” e “Epidemiology”. **Resultados:** Do ponto de vista patológico, nota-se que os carcinomas de células escamosas (CECs) constituem aproximadamente 90% dos cânceres de cavidade oral. Ele aparece mais comumente nos dois terços anteriores da língua. Outrossim, ele é mais comum em homens a partir dos cinquenta anos de idade. Um dos principais fatores de risco para os cânceres de cavidade oral é o uso de tabaco. É por isso que, na Ásia, onde residem 80% dos quase um bilhão de fumantes do mundo e onde o consumo de tabaco tem crescido, a incidência do carcinoma de células escamosas é alta. Além disso, o álcool é um fator de risco relevante, tanto para o carcinoma de células escamosas quanto para outros cânceres de boca, aparentando também ter um efeito sinérgico com o tabagismo. Ou seja, as duas práticas em conjunto manifestam risco bem maior do que a soma dos riscos individuais. Além deles, em décadas recentes, o papilomavírus humano (HPV) emergiu como um dos principais fatores etiológicos do carcinoma de células escamosas. **Conclusão:** Conclui-se que o CEC é o tipo de câncer de cavidade oral mais comum e que os principais fatores de risco para essa patologia são tabagismo, consumo de álcool e HPV. Portanto, são necessárias ações de conscientização para mitigar esses fatores, como reforço educacional das políticas contra o tabaco, contra o uso exacerbado de bebidas alcoólicas e da necessidade de vacinação contra o HPV.

Palavras-chave: Carcinoma, Células escamosas, Epidemiologia, Cavidade oral, Neoplasia.