



REVISÃO LITERÁRIA DE LINFOMAS NÃO HODGKIN

ALANE ANDRADE SOARES; BIANCA SILVA FARIAS

Introdução: Os Linfomas Não Hodgkin (LNH) são um grande grupo de tumores linfoides clonais, os quais podem ter origem de células B (85% dos casos), de células T (15% dos casos) ou de células Natural killer. Tem como sua característica principal um padrão de disseminação irregular, que pode evoluir para uma doença extranodal. Possui etiologia desconhecida na maioria dos casos, no entanto, há relação direta da doença com variações geográfica, translocações cromossômicas e agentes infecciosos como os vírus HTLV-1, Vírus Epstein-Barr, HHV-8, HIV-1, Hepatite C, Bactéria *Helicobacter pylori*, Protozoários Malária e entre outros. **Objetivo:** Promover o esclarecimento sobre os LNH mediante a apresentação das principais características dessa patologia como: epidemiologia, sinais clínicos e classificação. **Metodologia:** Este resumo foi baseado em revisões de literaturas e relatos de casos clínicos coletados nas plataformas Pubmed e Scielo entre os anos 2008 e 2023. **Resultados:** O LNH tem maior incidência em países industrializados, sendo composto por 40 subtipos histológicos diferentes, formados pela falha na imunorregulação dos linfócitos, as quais promovem o crescimento exacerbado das células B no tecido linfóide. Os aspectos clínicos gerais apresentados são: doença extranodal, linfonodomegalia assimétrico, indolor e em regiões periféricas, que também pode estar associado a sintomas sistêmicos como febre, sudorese noturna e perda de peso. Também pode existir envolvimento orofaríngeo, anemia, neutropenia, hepatomegalia e esplenomegalia. Ademais, o LNH pode ser classificado em baixo e alto grau. Os de baixo grau são: o linfoma linfocítico de células pequenas; linfoma linfoplasmocítico, Linfoma da zona marginal, Linfoma folicular, Linfoma de células do manto. Os linfomas de alto grau são: o Linfoma difuso de células grandes; Linfoma de tipo Burkitt; Linfoma linfoblástico, B ou T, Linfoma primário do sistema nervoso central, Linfonodopatia angioimunoblástica e entre outros. **Conclusão:** Dessa maneira, conclui-se que os LNH são neoplasias de células linfóides, por ser a nona causa de morte por câncer no sexo masculino e a sétima no sexo feminino, o qual totaliza 5% das mortes de paciente por câncer. Com isso, é importante destacar as características individuais de cada etiologia do LNH com o fito de um diagnóstico precoce e um tratamento adequado.

Palavras-chave: Linfomas não hodgkin, Epidemiologia, Etiologia, Sinais clínicos, Classificação.