



II Congresso Brasileiro
Multidisciplinar em Urgência
e Emergência On-line

MANIFESTAÇÕES DERMATOLÓGICAS DA SÍNDROME DRESS: REVISÃO INTEGRATIVA

VERÔNICA DE CAMARGO MENDANHA; EVANDRO MATHEUS DE OLIVEIRA ARAÚJO PEREIRA; MARIA CLARA AROUCHE COBUCCI; GABRIEL SEVERINO ALMEIDA; LETÍCIA CARNEIRO JACOPETTI

INTRODUÇÃO: A Síndrome da Farmacodermia com Eosinofilia e Sintomas Sistêmicos (DRESS) consiste em uma reação de hipersensibilidade medicamentosa grave, mediada por células T. Apresenta altos índices de morbimortalidade descritos na literatura, compreendendo sinais e sintomas clássicos, como febre, linfadenopatia, lesão de órgãos viscerais, anormalidades hematológicas e acometimento de pele, como a erupção cutânea, sendo esta de importante valor para o diagnóstico clínico e instituição precoce do manejo terapêutico. **OBJETIVOS:** Identificar e analisar as produções científicas acerca das manifestações dermatológicas da Síndrome da Farmacodermia com Eosinofilia e Sintomas Sistêmicos (DRESS) disponíveis na literatura publicada entre 2018 e 2023. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura publicada entre 2018 e 2023. A pesquisa foi realizada na base de dados PubMed, com os descritores “Dermatology”, “DRESS Syndrome” e “Hypersensitivity”. Foram encontradas 46 publicações, das quais realizou-se uma análise qualitativa e 4 foram selecionadas, grupo este que compreendia relatos de caso, caso-controle e revisões sistemáticas. **RESULTADOS:** Nos 4 artigos analisados, a erupção cutânea foi a manifestação dermatológica mais encontrada nos pacientes acometidos pela síndrome DRESS, sendo frequentemente morbiliforme, simétrica e maculopapular. A natureza das erupções cutâneas pode apresentar diversas morfologias, sendo observadas pústulas, púrpura, lesões em alvo e urticariformes, dermatite esfoliativa, bolhas e placas infiltradas. Inicialmente acomete a face, tronco e membros superiores, progredindo para membros inferiores. É relatado edema facial nos acometidos, além de dor em queimação ou prurido. **CONCLUSÃO:** O quadro clínico dermatológico da síndrome DRESS é caracterizado mais frequentemente por erupção cutânea morbiliforme, simétrica e maculopapular. Embora sempre presentes, as manifestações cutâneas são inespecíficas, sendo necessária a investigação de sintomas e alterações laboratoriais sistêmicas para a realização do diagnóstico.

Palavras-chave: Hypersensitivity, Dermatology, Dress syndrome, Dress, Dress syndrome.