



II Congresso Brasileiro  
Multidisciplinar em Urgência  
e Emergência On-line

## ANÁLISE DAS TENTATIVAS DE SUICÍDIO POR ENVENENAMENTO AUTOINFLIGIDO EM ADOLESCENTES E JOVENS

ANA CAROLINA PINTO LEITE FREIRE; CATARINA SILVA PEREIRA DE OLIVEIRA;  
MARIA RENATA GERBASE VIDAL; LORENA COSTA FRANCO LADEIRA; MARCOS  
ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA

**Introdução:** O suicídio é definido como uma morte autoinfligida intencional, qualificado como não fatal ou consumado. Suicídio não fatal trata-se de um ato de autoagressão cuja intenção é a morte, que acaba não ocorrendo, e o consumado consiste em um ato intencional de autoagressão que resulta em óbito. Entre os principais meios empregados, predomina-se a autointoxicação com a superdosagem de medicamentos ou agentes químicos como pesticidas. A tentativa de suicídio entre os adolescentes e jovens na faixa etária de 15-18 anos é frequente e as principais causas envolvem rejeição familiar, abuso sexual e perturbação nas relações afetivas. **Objetivos:** Discutir acerca dos caminhos que levam à tentativa de suicídio por diferentes métodos de autoenvenenamento em adolescentes e jovens. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura, na qual foi realizada na plataforma PubMed, do ano de 2019 a 2023, utilizando a combinação de descritores "Suicide", "Adolescent" e "Poisoning". Os critérios de exclusão foram o título em desacordo com a temática e o tipo de estudo. Foram selecionados 3 artigos pertinentes aos objetivos, lidos em sua totalidade para estudo do presente trabalho. **Resultados:** Os estudos evidenciaram que o suicídio por autoenvenenamento, causa habitual de hospitalização, ocorre mais comumente com o uso de medicamentos, agentes químicos (pesticidas), venenos ou drogas ilícitas. O paracetamol, seguido do ibuprofeno, se destacou como o medicamento mais consumido em tentativa de autoenvenenamento. Foi observado que as meninas são mais propensas as tentativas de suicídio por intoxicação do que os meninos e que, além disso, disputas familiares são a causa de 26-30% dos suicídios e os eventos mais comuns vivenciados antes da tentativa são problemas sociais, conjugais e familiares. **Conclusão:** As intoxicações agudas autoinfligidas e acidentais representam uma causa comum de hospitalização e internação entre adolescentes e jovens, principalmente no público feminino. Fatores biológicos, sociais, familiares e emocionais juntamente com o abuso de substâncias são responsáveis pelo índice elevado de autointoxicação com superdosagem de medicamentos, agentes químicos e/ou álcool.

**Palavras-chave:** Suicídio, Adolescente, Autointoxicação, Jovem, Envenenamento.