



O GÊNERO *COPAIFERA* L DETARIOIDEAE FABACEAE NO PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DOS VEADEIROS GOIÁS BRASIL

ROGER VIEIRA BRANDÃO; MARCOS JOSÉ DA SILVA

Introdução: *Copaifera* L., pertence a Fabaceae, subfam. Detarioideae e inclui 72 espécies distribuídas pelos trópicos do mundo, das quais 27 ocorrem no Brasil, sendo 16 endêmicas. Suas espécies, conhecidas pau d'óleo, copaíba ou copaibeiras, inclui árvores e arbustos que com folhas alternas e compostas por 2 a 12 pares de folíolos com nectários basais e pontuações translúcidas, inflorescências paniculadas com flores tetrâmeras e monoclamídeas, e legume monospermicos com sementes ariladas. A taxonomia de *Copaifera* é complexa e dispersa na literatura e no Brasil, o gênero, embora diverso, é pouco estudado em floras locais. **Objetivos:** Realizar um tratamento taxonômico para as espécies de *Copaifera* L. ocorrentes no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, Goiás, Brasil, uma área com diferentes fitofisionomias do Cerrado e com elevado número de espécies endêmicas. **Materiais e métodos:** Foram realizadas coletas para coleta de material botânico, obtenção de imagens das espécies em seus habitats, assim como estudada a literatura específica e coleções dos herbários UFG, IBGE, UB, CEN, SPF e MBM. **Resultados:** Foram registradas oito espécies: *C. depilis* Dwyer, *C. langsdorffii* var *grandifolia* Benth., *C. langsdorffii* var *langsdorffii* Desf., *C. malmei* Harms, *C. marginata* Benth., *C. oblongifolia* var *comosa* Dwyer., *C. oblongifolia* var *dawsonii* Cowan, *C. oblongifolia* var *oblongifolia* Mart. ex Hayne. Tais táxons crescem em bordas de matas ciliares ou de galeria ou em áreas abertas de cerrado típico, ralo ou em campos rupestres, próximas ou não a cursos d'água e se diferenciam pela forma e número de folíolos por folha, tipo de indumento nos ramos e sépalas, comprimento das inflorescência em relação às folhas e cor do arilo da semente. **Conclusão:** Os resultados encontrados exemplificam a riqueza de *Copaifera* na área estudada e contribui para o conhecimento do gênero em áreas de Cerrado do Brasil central. (Capes, UFG).

Palavras-chave: **FLORA; PAU D'ÓLEO; LEGUMINOSAE; CERRADO; TAXONOMIA**