



IMPLICAÇÕES CLÍNICAS DA MIIASE

LANNA DO CARMO CARVALHO; ANA CAROLINA BRETAS FERRARI; NELSON PINTO GOMES; FREDERICO GUERRA MONTEIRO; VITOR MIYASHIRO ARIAS DA SILVA

Introdução: A miíase cutânea condiz a uma aparição dermatológica, caracterizada pela circulação de larvas de determinadas espécies de mosca. Existem, três tipos de infecção cutânea, a qual variam com as espécies envolvidas, o tipo furunculoide, ferimento e kigratória. **Objetivo:** O seguinte estudo objetivou descrever as implicações clínicas desta. **Metodologia:** O seguinte estudo se trata de uma revisão bibliográfica, fundamentada nas plataformas do Scielo, PubMed, Latindex e Google Acadêmico utilizando os seguintes descritores: miiase, implicações cutâneas, berne, isolados oi de forma combinada tendo como período de referência os últimos 10 anos. **Resultados e Discussão:** A miiase cursa com uma tríade de infestações. O tipo furunculóide se manifesta com pápula ou nódulo eritematoso, junto de pontos pretos. A região da ferida é dolorosa, com sensação de mobilidade interna, prurido, odor fétido, exsudato sanguinolento, lesões cavernosas. O manejo terapêutico ideal não é padrão e varia conforme a disponibilidade de intervenções e também ao caso clínico, podendo ser expectante ou até extração cirúrgica. Destaca-se que a larva urge por oxigênio, a oclusão da abertura na pele facilita sua saída espontânea ou com pressão manual. Contudo, as larvas sem vida no decorrer da oclusão são resistentes remoção, desencadeando geralmente um processo inflamatório. Ademais, a administração de ivermectina por via oral ou tópica pode exterminar as larvas ou induzir sua migração. **Conclusão:** Acerca das informações expostas neste estudo, pode se elucidar que a manifestação por berne é algo benigno e autolimitada. Contudo, costuma gerar muito desconforto e estigma para o portador. Ademais, apesar de raro pode necessitar de intervenções mais invasivas.

Palavras-chave: **SAUDE PÚBLICA; MIIASE; AFECÇÃO CUTÂNEA**