



UM OLHAR ACERCA DA NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA À MULHER COM CANDIDÍASE VULVOVAGINAL EM UM SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE: REFLEXÕES EM UM CAMPO DE ESTÁGIO DA FARMÁCIA

ANITA MACIEL ALVES FURTADO

Introdução: A Candidíase Vulvovaginal (CVV) é causada pela cepa *Candida albicans*, um fungo do tipo levedura oportunista polimórfico que ocorre mais comumente na mucosa do trato genital feminino em mulheres com idade reprodutiva e se apresenta com prurido, disúria, inchaço e uma secreção branca. Este fungo já existe no organismo das mulheres e costumam permanecer em equilíbrio com a flora vaginal, mas em situações que ocorrem queda da imunidade, uso de antibióticos, gravidez, obesidade, uso de quimioterápicos e outros podem aumentar o risco de candidíase vaginal. **Objetivo:** O presente estudo tem como o objetivo relatar a experiência das aulas práticas de uma discente da Farmácia, abordando a realidade impactante encontrada frente à assistência e o aprendizado alcançado mediante as situações vividas. **Relato de caso/experiência:** Em uma Unidade Básica de Saúde do município de Juiz de Fora – MG, foi prestado um atendimento a uma mulher de 32 anos, que se contorcia devido aos sintomas de Candidíase Vulvovaginal, com receita para medicamentos prescritos para este fungo. Entretanto devido à verba fornecida ao sistema público de saúde, medicamentos para essa enfermidade não estão incluso para a compra e futura disponibilização gratuita para a população feminina. O impacto que isso gera às mulheres de comunidades carentes, além de dor e desconforto, é uma sensação de falha do sistema público de saúde para com as mulheres e as doenças biologicamente comuns que enfrentam. **Conclusão:** Conclui-se que em um sistema público de saúde que presta atendimento a mulheres que em sua maioria estão em idade sexual ativa e sujeitas a terem Candidíase Vulvovaginal, espera-se que o local de assistência à saúde mais próximo tenha a disposição medicamentos para todo o tratamento visto que uma única dose de um medicamento antifúngico oral (Fluconazol ou Intraconazol) ou a aplicação de um creme antifúngico (Miconazol) durante um a três dias cura infecções leves e apenas as infecções complicadas requerem tratamento de longo prazo.

Palavras-chave: **CANDIDÍASE VULVOVAGINAL; SAÚDE; FARMÁCIA**